

ՀՕՊԱՎ

ՀԱԼԻՄ ՎՈՅՏԻ ՇՆԱՌԱՎԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԼԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԻԿ ԽօՏԱՆ ԱՐԺԱՆ

ԱԱՀԱՐԵՎ ՀԱՅՈՒԹ ԿԱԽԱՇԻԿ ՕՐԱԾ

-ր, թի լա պատը սաւէ, կ պաւը ավելաց կաւը սուկօ՛ ասկաց կտ իւ, լո՛ ս, կ, ս

ՀԱՂԱ ԱՐԴՅՈՒՆ ԱԼԵՐ ԽՄ ՍՏԻԼ ԿԽՕՏԼԵՎԻՎ ԳՈՏԻԿ ԸԱԿՈ ՄԱԿԱ

ԱՅՈՇՎ ԲՐԱՄ, ԾԻԿ ԿՐԱՑԼ ԽՄ ՍՈՒՐԳՈՒԹԱ ԻՆՉ ԱԵՑՀԱԼԻ, ԼԱՌ ԱԼ ԲՐԱՄ ԵՎԻԼ ԹԱԿ

ԱՌԵՎԱՆ ՅԱԳԻԿԻ ՇՈՋԱԼԻՆԻ, ԱՐՄԵՆԻԱ ՀԱՅԿԱՆ

ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԽՈՎԱՆ ՇՐՋԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԽՈՎԱՆ ՇՐՋԱՆ

And another added And another added And another added And another added And another added

Edmund Reid Mann (1864-1938) was born in Liverpool, England.

[View Details](#) [Edit](#) [Delete](#)

GERMANY CALLING www.germany.de www.visitgermany.com

ΔΙΚΤΥΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΙΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΝΗΣΙ

חומרת אצל ילדים ומבוגרים. אצל ילדים עם אסתמה, חשיפה עשו פסיבי התוצאה היא סימפטום אסתמה מוגבר מהקרים מאוחרים יותר הראו את התדרדרות בתפקוד ריאה לאורך זמן קיים גם אצל אנשים אסתמה במחקריהם האורך רוב, הקצב של ירידת בריאה פונקציית היא מואצת אצל מעשנים עם אסתמה בהשוואה מעשנים עם אסתמה. לדוגמה, הדגימו אפקט תוסף של עישון ואסתמה על ירידת בכוח של עצמת FEV1 s (expiratory 1 s), שבו הכל המהירה ירידת בתפקוד הריאות אצל הגברים ונקבות נצפתה באסתמה עיינן בהשוואה בריא מעשנים או מעשנים אסתמה. עם זאת, ישנו גם כמה שליליות מחקרים, אך אלה כלל וייחסית נמוך מספר מעשנים עם אסתמה, "ויתכן היה כי כוח כדי להזות אפקט של חשיפה טבק על הירידה תפקוד הריאות. מואצת אובדן תפקוד הריאות בבגרות, כמו גם גורמי סיכון גנטיים וסיבתיים (מלבד עישון), וכן מגידול הריאות לתה מרבית הילדות עשו גם לתרום לפיתוח מתמיד שיבוש זרימת האויר אצל מעשנים עם אסתמה. אנשים עם היסטוריה של אסתמה קשה בילדים מיתמשים לעשן כמו מבוגרים עשויים להיות בסיכון. זה שווה וצין כי שינויים תפקוד ריאה אסתמה ניתן לשפר עמשבות של גAMILה מעישון עישון ופעילות מופחתת הסטרואידים רגישות חולית אסתמה שימושים פחות השפעות מעולות הטיפול לטוויה קוצר עד בינוינוים עם בשאייה קורטיוקוסטרואידים (ICS) או סטרואידים עם ביחס לשיפור תסמינים נשימותם, ריאות הפונקציה ואת החרפה המחרירים לעומת חולית אסתמה מי לא מעשנת. למרות גדל ICS המינון עשו להפוך חלקית בעית חוסר ריאות

מניסויים קליניים מצין כי ריגישות פחווה קורטיוקוסטרואידים נמשכת ללא התחשבות התוואי של המינעה של הטיפול או ניסוח של 16 ICS]. יש מוגבל נתונים על השפעת הטיפול לטוויה ארוך עםICS קצב הירידה בתפקוד הריאות אצל מעשנים עם אסתמה. ב- 23-24 חודשים מוגברים עם בינוי-ילקשה אסתמה, ICS לא להפחית הירידה השנתית של FEV1 אצל אנשים עישנו למעט קבוצת משנה של גברים שהיתה אור ללא עישון. בנוספים מחקר צפיתי הקצב של ירידת ב- FEV1 מעשנים עם אסתמה צומצם מ 58 בשנה בנותאים לא קבלת 31 ICS מ כל שנה בטיפול בקבלת טיפול אליה עם CS. כדי לתמוך במצבים אלה, התרונות של טיפול עם budenoside בשאייה למניעת תפקוד הריאות ירידת דומים או רעל מעשנים עם אסתמה מתמשכת קלה. מגנונים ההשלכות השליליות של מעשנים אסתמה המנגנונים החשובניים ההשלכות השליליות של עישון באסתמה, כולל שליטה סימפטום המסקן, מואצת ירידת בתפקוד הריאות, ריגישות פחותה סטרואידים הם הבינו, אבל סביר להניח בשל הבדלים דלקת דרכי הנשימה אצל מעשנים לעומת מעשנים עם אסתמה, יש עכשווי לצבירת ריאות כי שניהם עשו הטבק ודלקת אסתמה עלול לגרום לשינויים חשובים אנדווטיפ אסתמה עם דומיננטיות של הופען מקורות אחרים, ניטרופילים כמו COPD מוקדם לפיכך, ניתן הנשימה אסתמה ובכך להסביר סיגריות נהוג נוספים או סינרגטי דלקתיות, שיפוץ תגובות את דרכי הנשימה אסתמה ובכך להסביר שדוח עלוי התדרדרות תפקוד הריאות ואת חומרת מוגבר לשיבוש זרימת אויר. ניטרופילים יכול גם לתרום לריריים הפרשת יתר דרך שחרור של אלסטץ ניטרופילים, דרך אינדיוקציה של גנים חומצות הסמפולות אפייתל תא גבע ובלוטות הפרשת יתר תשת מוקז לחיה כרונית עשוי להיות גורם סיכון נוסף עבור הירידה המואצת של FEV1. חשוב, ידוע מספרים ניטרופילים באירועי תשבחות קצב של ירידת בתפקוד הריאות הרוב מעשנים עם אסתמה יש אנדווטיפ דלקת אסתמה אירועי, אך מספר רב יותר של תא פיטום הי גם מעשנים שזו עמו אסתמה בהשוואה מעשנים. התרומה היחסית דלקתיות בשל סיגריות עישון ואסתמה זו עשוי להשתנות בין אנשים בגין הבדלים משך ועצמת חסיפה לעשן סיגריה, וכן את משך הזמן ואת חומרת אסתמה. אפנון של דלקת, תיקון, תיקון פיטות (עורכו) היא גם תליה עדן מטሪיקס (MMPs) (metalloproteinases), מעכבי מהותי שלהם, מעכבי רקמות של metalloproteinases. ברוקרכוזי MMP-12 גבוזות אצל מעשנים עם אסתמה לעומת מעשנים עם אסתמה והרמות הם הפוך המשיך תפקוד ריאה וכל מה שקשרו באופן חיוני

זהו מינימום בדריכי הנשימה הם גורמים עיקריים של אסתמה החרפה, וזה יכול להיות ההשלכות ישירות על אסתמה המסקן לשולט בעישון לחולי אסתמה. רפואיים רבים מרגשים את זה לחולי אסתמה שעשנים יש ריגישות גדולה יותר זיהומיים בדריכי הנשימה, למרות שם מוגבל ספציפי

מחקר בתחום זה. הערכה בסיסית מאפייני המטופלים 101 הודה לבית החולים עם החרפה אסטמה. ריאנו-וירוס זיהוי היה בחום המשיכים אשפוז לאסטמה, ואחרי התאמת סיכון בסיסית, אסטמה, ריאנו-וירוס-חיביות חולים היו בסביבות גבוהה יותר להיות מעשנים ביום. פטאל וודוח כי עישון סיגריות באסתמה קשורה תדריות גבוהה יותר של exacerbations. בנוסף, מצאים הקהילה האירופית הסקר הנשייה בריאות מופיעים מציע כי יתכן בהתקף אסתמה חריפה חידקת קשורה לעישון הורים

מלבד השיקול ברור העישון הזה לורנס יש יתרון הבריאות הכללית, משתיית עישון מאי גם לריאות מועל עבור מספר היבטים ספציפיים של אסטמה שליטה. למורות ההשפעות ברישול המדואחת של עישון על תסמני האסתמה, הענות הסטרואידים ותפקיד הריאות, רק מעט מחקרים בחנו את התפקיד של עישון הפסקת על תוצאות אסטמה. באופן כללי, מחקרים אלה מראים שיפורים התסמינים ואת תפקידו ריאה אלה חולית אסטמה מי להפסיק לעשן בהצלחה בסדרה של מחקרים במחנה, הוצגה תאופילן במינון נמוך כדי לשחרר את רגישות הסטרואידים כנראה על ידי הגדלת פעילות HDAC2, אשר מדויק אצל מעשנים. ראשוני הנתונים עולה כי התוספת של מינון נמוך מתמשכת שחרור תאופילן משבץ ATCS ורגישות כפי שנמדד על ידי הריאות פונקציית אצל מעשנים עם אסטמה [96]. אם מחקרים גדולים יותר מאשר אלה מציאת, שילוב טיפול זה עשוי להיות בעל ערך. ניהול מעשנים אסטמה. תאופילן במינון נמוך הוא חשוב לפעול, לפחות בחלקו, דרך עיכוב של phosphoinositide-3 kinases

מסקנות וכיונים עתידיים האינטראקציה בין עישון לבין אסטמה מהוות מרבות אתגרים עבור החוקר, המטפל והמטופל. מעשנים אסטמה יכול ליצא ברורים "פונטייפ'" עם חיסונית מובהק-סלולר משתנה, כמו גם ליקוי תרופתי אפקטים של תגובה התנוגותית עישון הפסקת ניהול. מולדת המערכת החיסונית dysregulation של לעשן בחדר אחרונה תואר, אבל מודיע מצב זה מתרחש, אין זה יכול להיות מואופן איין בורר. מגנונים של הסטרואידים רגישות אצל מעשנים עם אסטמה הם גם הבינו. נתן כי לא כל המעשנים עם אסטמה הן רגישות ל-ATCS, חיפוש מפתח פונטייפ' גורמים מנבאים על חוסר רגישות זו עשוי להיות אזור חשוב עבור בעtid לפתח בחקירה. ההכרה מוגברת פעילה אסטמה ועישון הוא אכן צריך לקיים יחסי מסוכנים התוצאה להשקייע מאצימים גדולים יותר לפתח ולעודד את בטוח וסטרטגיית הימנענות ונוטנים הפסקת עישון יעליה.

שיעור שכיחות גבוהה של עישון סיגריות באסתמה, במיוחד בעולם המתפתח, הרמה היורדה של אסטמה שליטה מנוסים על ידי חולים אלו למורות טיפולים שוטפים שיעור נמוך של גמילה מעישון כל להציג את הצורך טיפולים משופרים עבור מעשנים עם אסטמה. זה חשוב כי העtid אקדמי מבוקר ניסויים של טיפולים חדשים להיות שפותחה עבור אסטמה המגנים מעשנים בהוות וב עבר עם אסטמה, כולל אלה עם היסטוריה עישון כבד בעוצמה, כדי לאפשר רפואי מופעל תת-חברה מתוכנן מראש ניתוח. סמיים רפואיים סוכניות צריך לספק תמייה למשרה זו על ידי מבקש לימודי מתאים אצל מעשנים עם אסטמה לפני רפואי טיפולים חדשים עבור אסטמה